

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS
analog einer Fachinformation*

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

metavirulent® Mischung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoffe:

1 g Mischung (entspricht ca. 37 Tropfen) enthalten:

Acidum L(+)-lacticum Dil. D15 [HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 15% (m/m)]	30 mg
Aconitum napellus Dil. D4	20 mg
Ferrum phosphoricum Dil. D8	500 mg
Gelsemium sempervirens Dil. D4	30 mg
Gentiana lutea Ø	20 mg
Influenzinum-Nosode Dil. D30 [HAB, Vorschrift 44]	100 mg
Luffa operculata Dil. D12	100 mg
Veratrum album Dil. D4	200 mg

Bestandteile 1-7 gemeinsam potenziert über die letzte Stufe

Sonstige Bestandteile: siehe Abschnitt 6.1.

Gesamthethanolgehalt 37 Vol.-%

3. DARREICHUNGSFORM

Mischung zum Einnehmen

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Grippale Infekte.**

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung:

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren gilt: Bei akuten Zuständen über 2 Tage, höchstens 12mal täglich, je 5-10 Tropfen einnehmen. Bei Nachlassen der Beschwerden ist die Dosis zu reduzieren oder das Mittel abzusetzen.

Die Gebrauchsinformation enthält folgenden Patientenhinweis:

Für die Anwendung von metavirulent® bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Daten vor, daher Gabe nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Art der Anwendung:

Tropfenweise auf die Zunge geben (perlingual) oder mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen schräg in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

Dauer der Anwendung:

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Bei Nachlassen der Beschwerden ist die Dosis zu reduzieren oder das Mittel abzusetzen.

Die Gebrauchsinformation enthält folgenden Patientenhinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Dauern die Beschwerden länger als 2 Tage unverändert an oder verschlimmern sich, sollte die weitere Anwendung

nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

4.3 Gegenanzeigen

Nicht anzuwenden bei Alkoholkranken und bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile (siehe 6.1).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sowie hohem oder persistierendem Fieber sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen.

Die Gebrauchsinformation enthält folgenden Patientenhinweis:

Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, ist eine ärztliche Abklärung dringend erforderlich.

Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis bis zu 0,08 g Ethanol. Nach der Arzneimittel-Warnhinweisverordnung (AMWarnV) ist erst ab einer maximalen Einzelgabe nach der Dosierungsanleitung über 0,5 g Ethanol auf ein gesundheitliches Risiko bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern hinzuweisen.

Trotz Unterschreitung des Alkoholgehalts – laut AMWarnV – bei einer maximalen Einzeldosis enthält die Gebrauchsinformation folgenden Patientenhinweis: *Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.*

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis in der Gebrauchsinformation:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel abgeschwächt werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen (klinische Studie) wurden aber noch nicht durchgeführt.

Die Gebrauchsinformation enthält folgenden Patientenhinweis:

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

metavirulent® hat bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen. Bei Einnahme erheblicher Mengen ist der Alkoholgehalt zu beachten.

4.8 Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden

vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei erneuter Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen:

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale Meldesystem anzuzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

4.9 Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierungen berichtet. Aufgrund der Verdünnung der Wirkstoffe sind keine nachhaltigen Auswirkungen einer moderaten Überdosierung zu erwarten. Bei Einnahme erheblicher Mengen ist der Alkoholgehalt zu beachten.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Homöopathika und Anthroposophika
ATC Code: V60

Die Homöopathie versteht sich als Regulations-therapie. Die Wirksamkeit leitet sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildern der Einzelbestandteile ab:

Acidum L(+)-lacticum (Rechtsdrehende Milchsäure)
Muskelschmerzen

Aconitum napellus (Blauer Eisenhut)
Hochakute, entzündliche Erkrankungen

Ferrum phosphoricum (Eisen-III-phosphat)
Fieberhafte, entzündliche Erkrankungen der Atemorgane

Gelsemium sempervirens (Gelber Jasmin)
Kopfschmerzen, Infektionskrankheiten

Gentiana lutea (Gelber Enzian)
Verdauungsstörungen

Influenzinum-Nosode (Autoklavierte Zubereitung aus Influenza A und B)
Grippaler Infekt

Luffa operculata (Schwammgurke)
Schnupfen, Heuschnupfen

Veratrum album (Weiße Nieswurz)
Drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten

Quelle: Anwendungsgebiete nach den Monographien der Kommission D, veröffentlicht im Bundesanzeiger

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Es liegen keine Daten zu den pharmakokinetischen Eigenschaften vor.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Für die Anwendung am Menschen sind keine besonderen Gefahren zu erwarten.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Ethanol, gereinigtes Wasser

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Originalpackung: 5 Jahre nach Herstellung
Nach Anbruch: 1 Jahr

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Möglichst nicht in unmittelbarer Nähe starker elektromagnetischer Felder (Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde) lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Braunglasflaschen mit Tropfeinsatz

50 ml Mischung zum Einnehmen (N1)
100 ml Mischung zum Einnehmen (N2)
1000 ml Mischung zum Einnehmen (Anstaltspackung)

Wie bei allen Naturstoffpräparaten können gelegentlich Trübungen auftreten, die aber keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit haben.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

7. INHABER DER ZULASSUNG

meta Fackler Arzneimittel GmbH
Philipp-Reis-Straße 3
31832 Springe
Telefon: 05041 9440-0 • Telefax: 05041 9440-49
E-Mail: kontakt@metafackler.de

8. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 6192465.00.01

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/ VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

06.12.2002

10. STAND DER INFORMATION

Februar 2022

11. VERSCHREIBUNGS-/APOTHEKENPFLICHTIG

Apothekenpflichtig


Natürlich starke Abwehr



Erkältung?
Aber nicht
mit mir!

Bleib cool,
wenn es Dich kalt erwischt.

